

ACIP專家會議COVID-19疫苗接種建議

1/2

莫德納次世代雙價疫苗接種規劃

- **第一階段：65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者**
- **第二階段：第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者**

2022/09/06

中央流行疫情指揮中心

ACIP專家會議COVID-19疫苗接種建議

2/2

建議調整追加劑接種間隔為與上一劑間隔至少3個月以上
(包含現行單價及次世代雙價疫苗)

- 包含基礎劑最後一劑/基礎加強劑與第一次追加劑、第一次追加劑與第二次追加劑、第二次追加劑與第三次追加劑之間隔，確診後亦需間隔3個月後接種
- 12至17歲青少年追加劑接種間隔亦調整為與基礎劑最後一劑/基礎加強劑間隔至少3個月以上

Novavax COVID-19疫苗12至17歲青少年接種建議

- 接種2劑基礎劑，2劑間隔至少4週以上
- 建議以同製程疫苗完成基礎劑接種
- 可提供作為12至17歲青少年追加劑接種使用(可與基礎劑不同廠牌)

2022/09/06

中央流行疫情指揮中心

機構住民請假外出防疫小提醒

依據現行「住宿式長照機構COVID-19強化管制措施」

- 請假未外宿，原則不需篩檢
- 請假外宿，返回前7日內曾有COVID-19暴露風險¹者，需篩檢：
 - ① 出具返回前採檢之自費篩檢陰性證明^{2、3}
 - ② 返回第3至4天及第7天，各1次自費篩檢^{2、3}
 - ③ 返回次日起7天內避免參加團體活動²
- 鼓勵住民使用臺灣社交距離APP，於進入機構前出示該APP畫面

1. 暴露風險包括會接觸處於可傳染期之**確診/居家隔離/自主防疫/居家檢疫者**、或具有發燒或呼吸道症狀等疑似感染症狀者等情形。
2. 確診個案符合解隔離條件，且距發病日或採檢陽性日(無症狀者適用)15天以上至3個月內，得免除各項篩檢。
3. 自費篩檢陰性證明包含抗原快篩或PCR，進入機構前之篩檢以當日抗原快篩為主，亦得使用前2日內採檢之PCR結果。使用家用試劑自行檢測或由醫事人員採檢檢測皆可。